Op.Dr. Sina Kaderi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Adres: Bağdat Caddesi, Bostancı – İstanbul
Telefon: +90 501 062 03 03 | E-posta: info@sinakaderi.com | Web: www.sinakaderi.com

DUDAK KALDIRMA AMELİYATI · AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Tarih / Saat: .....

Hasta adı soyadı: .....
Doğum tarihi: .....
T.C. / Pasaport no: .....
İşlem tarihi: .....
Planlanan Işlem:
☐ Extended Lip Lift
☐ Alt Dudak Lip. Lift
☐Corner Lip Lift
☐ Revizyon:.....
☐ kombine : .....

Anestezi:
☐ Lokal Anestezi
☐ Genel Anestezi

1. AMELİYATIN TANIMI VE AMACI

Lip Lift, burun tabanı ile üst dudak arasındaki mesafenin cerrahi olarak kısaltılması ve üst dudağın yeniden konumlandırılması işlemidir. Burun tabanındaki doğal kıvrımlar boyunca kesi yapılarak planlanan miktarda deri çıkarılır. Amaç dudak konturunu, kırmızı dudak görünürlüğünü ve yüz oranlarını iyileştirmektir. Sonucun hastanın anatomisine göre farklılaşacağını ve belirli bir dudak şeklinin garanti edilemeyeceğini biliyorum.

2. CERRAHİ TEKNİK VE KAS MÜDAHALESİ

Klasik (Bullhorn) Lip Lift genellikle deri eksizyonu ve doku tespiti içerir. Extended Lip Lift, hastaya göre genişletilmiş diseksiyon, derin yumuşak doku tespiti, kesinin yanlara uzatılması ve gerektiğinde orbicularis oris kasının diseksiyonu, yeniden şekillendirilmesi veya sütürlerle tespitini içerebilir. Her hastada aynı manevralar uygulanmaz. Kas müdahalesinin dudak hareketlerini etkileyebileceği tarafıma açıklanmıştır.

3. OLASI RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR

İz ve yara iyileşmesi: Burun tabanında kalıcı ameliyat izi oluşur; iz genişleyebilir, renk değiştirebilir, belirgin, kabarık veya çökük olabilir. Yara açılması, gecikmiş iyileşme ve nadiren doku kaybı gelişebilir.
Şekil ve simetri: Dudakta asimetri, kontur düzensizliği, aşırı veya yetersiz kaldırma, üst dişlerin fazla görünmesi, burun kanatlarında / burun deliklerinde biçim değişikliği ve estetik memnuniyetsizlik oluşabilir.
Fonksiyon ve duyu: Dudak kapanışında güçlük, gülümseme / konuşma / dudak büzmede değişiklik, gerginlik, sertlik, uyuşukluk, karıncalanma veya his kaybı gelişebilir. Özellikle kas müdahalesi sonrasında geçici, nadiren kalıcı işlev değişiklikleri görülebilir.
Genel cerrahi riskler: Kanama, hematom, enfeksiyon, alerjik reaksiyon, skar dokusu / fibrozis, dolaşım bozukluğu ve anesteziye bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Uçuk öyküsü olanlarda herpes tekrarlayabilir.
Revizyon: İstenmeyen görünüm veya komplikasyonlar nedeniyle ek tedavi ya da revizyon ameliyatı gerekebilir; tam düzelme garanti değildir ve ek maliyet söz konusu olabilir.

4. ALTERNATİFLER VE SONUCUN SINIRLARI

Ameliyat olmamak, uygun olgularda dolgu uygulamaları veya farklı dudak estetiği teknikleri seçeneklerdir; dolgu, uzun filtrumu cerrahi olarak kısaltmaz. Lip Lift kalıcı anatomik değişiklik oluşturur ancak yaşlanma ve doku değişimleri devam eder. Tam simetri, görünmez iz ve ömür boyu değişmeyen sonuç garanti edilemez.

5. İYİLEŞME VE BAKIM

İlk günlerde ödem, morarma ve hassasiyet beklenebilir; çoğunlukla 7–10 günde azalır. Dokuların yumuşaması aylar. sürebilir; izin olgunlaşması genellikle 6–12 ay veya daha uzun sürer. Dudakları aşırı germemeli; yara bakımı, ilaç kullanımı, nikotinden uzak durma, güneşten korunma ve kontrol önerilerine uymalıyım. Artan ağrı, kanama, ateş, akıntı, hızla büyüyen şişlik veya renk değişikliğinde derhâl tıbbi yardım almalıyım.

6. HASTA BEYANI VE KARARI

Hastalıklarımı, ilaçlarımı, alerjilerimi, sigara / nikotin kullanımımı ve önceki işlemlerimi doğru bildirdiğimi beyan ederim. Ameliyatın yöntemi, alternatifleri, kalıcı iz, asimetri, dudak / burun biçim ve hareket değişikliği, komplikasyon ve revizyon riskleri bana anlaşılır biçimde anlatıldı. Sorularımı sorma fırsatım oldu. Ameliyatı reddedebileceğimi ve işlem başlamadan rızamı geri çekebileceğimi biliyorum.

Hasta adı soyadı: ..... İmza: .....